



L'alliance réussie

- Polyvalence Oidium(s) et Black-rot
- Persistance d'action
- Souplesse d'emploi



Tokra[®] WG

FICHE TECHNIQUE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien habituel ou à consulter le site www.ascenza.fr



Tokra® WG

Composition : 250g/kg Krésoxym-méthyl et 87,5 g/kg Penconazole - Granulés dispersables (WG)

TOKRA® WG est une préparation associant deux substances actives aux modes d'action différents et complémentaires, destinée à lutter contre l'oïdium et le black-rot de la vigne.


TABLEAU DES USAGES

CULTURE	CIBLES	DOSE MAXIMUM D'EMPLOI	NOMBRE MAXIMUM D'APPLICATIONS	CONDITIONS D'EMPLOI	STADE D'APPLICATION	DÉLAI AVANT RÉCOLTE (DAR)	ZNT* AQUATIQUE
Vigne (Uniquement autorisé sur sols alcalins et neutres)	Oïdium(s) Black-rot	0,4 kg/ha	1/an	Limitation à 2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies	BBCH 15 - 69	F (BBCH 69)	5m
			2/an		BBCH 69 - 85**	35 jours	5m

* Zone non traitée (voir phrase SPe 3)

** Si une application faite entre les stades BBCH 15-69 alors une seule application autorisée entre les stades BBCH 69-85.

POSITIONNEMENT



RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Oïdium


Contre l'oïdium, TOKRA® WG s'applique de préférence en préventif pendant la période de grande sensibilité de la vigne.

Black-rot

TOKRA® WG peut s'utiliser du stade « Grappes visibles » jusqu'au stade « Véraison ».


RÉSISTANCE AU LESSIVAGE

% intensité d'attaque oïdium sur feuilles




Étude de résistance au lessivage sur jeunes plantes en pot (cépage Cinsaut) en conditions contrôlées


Intensité d'attaque d'oïdium avec 60 mm de pluie 12 jours après l'inoculation




ACTION PRÉVENTIVE ET CURATIVE



MODE DE DISTRIBUTION UNIQUE



GESTION DES RÉSISTANCES



UNE ALLIANCE RÉUSSIE

- ✓ Dose modulable en fonction du risque
- ✓ Persistance d'action jusqu'à 14 jours
- ✓ Souplesse d'emploi

TOKRA® WG : AMM n°2160935 - Marque déposée par ASCENZA - Composition : 250g/kg Krésoxym-méthyl et 87,5 g/kg Penconazole - Granulés dispersables (WG) - Distribué par Ascenza France Immeuble Odyssee - A3, 2-12 rue du Chemin des Femmes 91300 MASSY - www.ascenza.fr - Tél 01 69 53 98 89.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, restrictions d'emploi et contre-indications se référer à l'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Mai 2020



H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H361d Susceptible de nuire au fœtus. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

ATTENTION



PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.