

Cap sur les dicots

- Efficacité reconnue : gaillet, coquelicot...
- Utilisable sur toutes céréales
- Souplesse de mélange



Rackam®

FICHE TECHNIQUE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher
de votre technicien habituel ou à consulter le site
www.ascenza.fr



ASCENZA®
— FARMING YOUR FUTURE —



Rackam®

Composition : florasulame 50 g/L – HRAC : 2 = B – Formulation : suspension concentrée (SC)

Le florasulame est un herbicide foliaire et racinaire appartenant à la famille chimique des sulfonylurées. Il agit en inhibant l'enzyme ALS. RACKAM® est rapidement absorbé par les feuilles, lui permettant d'être à l'abri du lessivage en moins d'une heure.

USAGES AUTORISÉS

USAGES	DOSE MAX D'EMPLOI	NBRE MAX D'APPLI-CATIONS	STADES D'APPLI-CATION	DAR	ZNT AQUA (M)	ZNT PLANTES NON CIBLES (M)	COMMENTAIRES
Avoine et seigle d'hiver	0,08 l/ha	1 / an	BBCH 11 - 20	type F	20 (dont DVP 20)	5	Application avant repos végétatif
	0,15 l/ha		BBCH 11 - 32		20 (dont DVP 5)		Application après reprise de végétation
Avoine et seigle de printemps	0,15 l/ha		BBCH 11 - 32		5		-
Blés d'hiver	0,08 l/ha		BBCH 11 - 20		20 (dont DVP 20)		Application avant repos végétatif
Blé tendre d'hiver	0,15 l/ha		BBCH 11 - 39		20 (dont DVP 5)		Application après reprise de végétation
Blé dur, triticale d'hiver	0,15 l/ha		BBCH 11 - 32		20 (dont DVP 5)		Application après reprise de végétation
Blés de printemps	0,15 l/ha		BBCH 11 - 32		5		-
Orge d'hiver	0,08 l/ha		BBCH 11 - 20		20 (dont DVP 20)		Application avant repos végétatif
	0,15 l/ha		BBCH 11 - 39		20 (dont DVP 5)		Application après reprise de végétation
Orge de printemps	0,15 l/ha		BBCH 11 - 39		5		-
Graminées fourragères	0,08 l/ha		BBCH 12 - 29		20 (dont DVP 20)		Uniquement sur cultures non établies avant repos végétatif
	0,08 l/ha		BBCH 12 - 29		5		Uniquement sur cultures établies avant repos végétatif
	0,15 l/ha	BBCH 12 - 32	20 (dont DVP 5)	Uniquement après reprise de végétation			

Délai de rentrée : 6 heures – DSPPR : 3 mètres

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

- ✓ Peu sensible aux températures, RACKAM® peut être appliqué dès 5°C.
- ✓ Pour une bonne pénétration du produit, respecter un délai sans pluie d'une heure.
- ✓ Ne pas appliquer RACKAM® pour désherber une céréale sous-ensemencée d'une légumineuse.
- ✓ RACKAM® n'est pas sélectif des trèfles dans les graminées fourragères.
- ✓ Appliquer sur une culture en bon état végétatif, non stressée par le froid ou un excès d'eau.
- ✓ Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 % pour les usages sur céréales d'hiver et « graminées fourragères ».

RACKAM® : AMM n°2150870 – 50 g/l de florasulame - Suspension concentrée (SC). © Marque déposée : ASCENZA - détenteur d'homologation : GLOBACHEM. Distribué par ASCENZA, 27 avenue Carnot - Immeuble South Station - 91300 MASSY - www.ascenza.fr - Tél : 01 69 53 98 89. Distributeur de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Annule et remplace toute version précédente. Pour les usages autorisés, doses, restrictions d'emploi et contre-indications se référer à l'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Novembre 2023.

P102 Tenir hors de la portée des enfants. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

LARGE SPECTRE

RACKAM® est actif contre de nombreuses dicotylédones. Il doit être appliqué sur des adventices jeunes de préférence.

	Automne	Printemps
Alchémille		
Ammi élevé		
Anthémis des champs		
Bleuet des champs (plantules)		
Capselle bourse à pasteur		
Céraiste aggloméré		
Coquelicot* (< 5 cm)		
Féveroles (repousses)		
Gaillet gratteron		
Lampsrane		
Matricaire camomille*		
Pensée		
Ravenelle		
Renouée des oiseaux		
Renouée faux-liseron		
Repousses de Colza		
Rumex		
Sanve		
Séneçon commun*		
Stellaire*		
Véronique		

* En présence d'adventices peu sensibles dans la parcelle, RACKAM® doit être intégré dans un programme de lutte permettant de maîtriser l'ensemble des adventices.

	Très sensible : > 95 % d'efficacité
	Sensible à très sensible : > 85 % d'efficacité
	Moyennement sensible : 70 à 84 % d'efficacité
	Peu sensible : < 70 % d'efficacité



ASCENZA®

EUH208 Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.